



Favoriser la nidification de l'Effraie des clochers et de la Chevêche d'Athéna dans le Roannais

L'hexagone n'échappe pas à la tendance mondiale : les oiseaux déclinent dangereusement. L'Observatoire National de la Biodiversité (ONB), organisme créé en 2009 et piloté depuis 2017 par l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB), révèle en effet que, toutes espèces confondues, les populations d'oiseaux vivant en milieux agricole, urbain et forestier **ont chuté de 22 % entre 1989 et 2017**. Plus alarmant, même les espèces dites « généralistes », qui peuvent s'adapter à n'importe quel environnement pour survivre, déclinent depuis 2011. Et c'est surtout dans les campagnes que le phénomène est le plus marqué, avec la disparition d'un tiers des oiseaux vivant dans ce milieu depuis 1989.

Le Département a mis en évidence la nécessité de travailler sur les espèces faunistiques ligériennes en définissant plus de 275 espèces animales parmi les vertébrés et invertébrés qui ont été classés comme espèces faunistiques prioritaires. Parmi de nombreux projets, le Conseil départemental a sélectionné celui de l'ARNP qui souhaite favoriser la nidification de l'Effraie des clochers et de la Chevêche d'Athéna sur sept communes du piedmont Roannais.

Présentation des espèces : Effraie des clochers et Chevêche d'Athéna

L'Effraie des clochers (*Tyto alba*) et la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) sont des oiseaux nicheurs présents toute l'année en France dont les populations sont en déclin depuis les années 90. Au niveau régional, elles



Effraie des clochers



sont classées « **VU** » : vulnérable (*liste rouge Rhône-Alpes 2008*) et « **LC** » : préoccupation mineure, sur la *liste rouge mondiale* (2016).

L'Effraie est associée aux milieux ouverts et bocagers, à proximité de bâtis. En effet, elle chasse dans les prairies, lisières et nidifie généralement dans les bâtiments anciens ou peu fréquentés comme les granges qui se font de plus en plus rares ou les églises de moins en moins accessibles. La chevêche en termes de territoire de chasse et d'habitat vit dans des zones plates, agricoles et légèrement arborées.

- Plusieurs menaces directes et indirectes sont présentes :

L'utilisation des pesticides, les changements dans leur habitat (destruction des haies, fragmentation du milieu, rénovation des bâtiments, urbanisation), collision avec des véhicules.

- Indicatrices de la qualité d'un environnement :

Ce sont des bio-indicateurs, leur présence signifie que la zone n'a pas été détruite par des pollutions diverses. Elles débarrassent les agriculteurs des mulots et autres petits rongeurs.

- Les gestes pour les protéger :

- Installer des nichoirs
- Conserver des accès dans les anciens bâtiments ou églises
- Conserver des arbres creux, murs à cavités



Chevêche d'Athéna

Pourquoi ce projet dans votre commune ?

Un certain nombre de communes situées sur la côte roannaise restent pauvres en données en ce qui concerne les espèces bien que pourvues d'habitats favorables (site de nidification, territoire de chasse).

L'étude s'intéressera notamment aux sites susceptibles d'être utilisés par l'Effraie des clochers (granges, églises, greniers, etc.) et la Chevêche d'Athéna (vieux arbres, saules têtards, bâtiments, murailles, etc.).



Chouette ma commune

